FICHA TÉCNICA

RATICIDA BLOCO CITROMAX

Classe:.....Raticida
Ingrediente Ativo:.....Brodifacoum
Formulação:.....Bloco
Categoria:.....Empresa Especializada
Registro no M.S./ANVISA:.....329230041

COMPOSIÇÃO

Brodifacoum:.....0,005% p/p
Inertes (Atrativos, conservante, corante e desnaturalizante:.....99,995% p/p

INDICAÇÕES DE USO

Raticida Bloco Citromax é um produto para Empresas Especializadas eficaz contra ratazanas (*Rattus rattus*) e ratos (*mus musculus*).

INSTRUÇÕES DE USO

O Raticida Bloco Citromax deve ser colocado onde os roedores vivem e transitam, como tocas, trilhas, túneis, etc. Dependendo do grau de infestação, colocar de 1 a 5 pacotes de 20g em cada ponto de iscagem. Nas trilhas, próximo aos rodapés, os pontos devem estar distantes 5 metros um do outro. Recomenda-se sempre que possível a utilização de caixas porta-iscas, onde o raticida ficará protegido das intempéries, além de dificultar o acesso de animais não alvo. Os pontos de iscagem devem ser inspecionados a partir do 3° dia após a aplicação, para verificação do consumo e remanejamento nos locais onde as iscas não forem consumidas. **A embalagem do produto deve permanecer fechada.**

PRECAUÇÕES

- Conserve fora do alcance de crianças e dos animais domésticos. 'Perigoso se ingerido, inalado ou absorvido pela pele'.
- Não aplicar sobre alimentos, utensílios de cozinhas, plantas e aquários.
- Não fumar ou comer durante a aplicação.
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Manter o produto na embalagem original.
- Só utilizar em lugar de difícil acesso a crianças e animais domésticos.
- Não coloque este produto em utensílios para uso alimentar.
- Durante a aplicação, usar luvas e evitar o contato com a pele.
- Aplicar em lugares inacessíveis para crianças e animais domésticos.
- Não aplicar em tubulações de ar ou fonte de ventilação que possibilitem a liberação do rodenticida no ambiente.
- As mulheres grávidas não podem manipular o rodenticida.
- Conservar em local desratizado em perfeita condição de limpeza.
- Não transportar com alimentos nem medicamentos.
- Descartar os roedores mortos, restos de iscas e embalagens, envolvendo previamente os mesmos, usando luvas e sacos de lixo.
- Pessoas e animais, retornar ao ambiente somente após duas horas do término da aplicação do produto.
- Não havendo caixas porta-iscas, colocar o produto dentro das tocas dos ratos ou protegidos em seus caminhos.
- O fabricante garante as propriedades físico-químicas, bem como o teor de substância ativa do produto, se armazenado nas embalagens originais, fechadas e em local seco e fresco.
- O fabricante não se responsabiliza por danos causados pelo emprego do produto em desacordo com as indicações desta ficha técnica.
- Tempo de reentrada: Pessoas e animais retornar ao ambiente somente após 2 horas do término da aplicação do produto.

PRIMEIROS SOCORROS

- Em caso de contato direto com este produto, lave a parte atingida com água corrente e sabão.
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente em abundância.
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.

- Em caso de ingestão, não provoque vômito.
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviços de Saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto.

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:
Grupo Químico:.....Hidroxicumarinas
Nome Comum:.....Brodifacoum
Antídoto:.....Vitamina K1 Injetável
Tratamento:.....Tratamento sintomático
Disque Intoxicação: CEATOX 0800 722 6001

FABRICADO POR:
Citromax Indústria e Comércio LTDA,
CNPJ: 00.187.467/0001-92
Mario Pagliosa, 708, Área Industrial Sul
São Lourenço do Oeste – SC/CEP:89990000
www.citromax.ind.br
sac@citromax.ind.br
Fone: (49) 3344-3087

Elaborado em 29/08/2019
Revisão n° 01 em 17/09/2020