



FICHA TÉCNICA

FORMICIDA IMIDACLOPRID CITROMAX

Classe:.....Inseticida
Ingrediente Ativo:.....Imidacloprid
Formulação:.....Líquido
Categoria:.....Empresa Especializada
Registro no M.S./ANVISA:.....329230140

COMPOSIÇÃO

Imidacloprid:.....20% p/p
Inertes (Dispersante, emulsificante, umectante, espessante, atenuador de espuma e veículo):.....80% p/p

INDICAÇÕES DE USO

Formicida Imidacloprid Citromax é um inseticida de Empresa Especializada eficaz contra formigas (*Monomorium floricola*).

INSTRUÇÕES DE USO

Agite antes de usar. Diluir o Formicida Imidacloprid Citromax na concentração de 2 ml do produto em 1 L de água, ou 20 ml do produto em 10 L de água e aplicar usando um pulverizador manual ou costal, na dose de 150 ml por m² nos esconderijos dos insetos alvo. Para controle utilizar a diluição de 100 ml do produto para 10 L de água.

PRECAUÇÕES

- **Conserve fora do alcance de crianças e dos animais domésticos. 'Cuidado, perigoso se ingerido, inalado ou absorvido pela pele'.**
- Não aplicar sobre alimentos, utensílios de cozinhas, plantas e aquários.
- Não fumar ou comer durante a aplicação.
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Manter o produto na embalagem original, em lugar seguro, seco e ventilado.
- Aplicar o produto nas horas com temperaturas mais amenas do dia e finais de tarde.

- Aplicar onde não tem acesso de crianças e animais domésticos.
- Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos.
- Seguir rigorosamente as medidas de segurança e precauções descritas nessa ficha para evitar acidentes.
- Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção respiratória e ocular.
- **Armazenamento:** Conserve em temperatura entre 15 e 30 °C.
- **Tempo de reentrada:** Pessoas e animais retornar ao ambiente somente após 2 horas do término da aplicação.

PRIMEIROS SOCORROS

- Em caso de contato direto com este produto, lave a parte atingida com água corrente e sabão.
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente em abundância.
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.
- Em caso de ingestão acidental, não provoque vômito.
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviços de Saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto.

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:

Grupo Químico:.....Neonicotinoide
Nome Comum:.....Imidacloprid
Ação tóxica:.....Agonista da acetilcolina
Antídoto:.....Não há antídoto específico
Tratamento:.....Tratamento sintomático
Disque Intoxicação: CEATOX 0800 722 6001

Responsável Técnica: Mariane C. Pesenti
CRQ 13202017 XIII Reg

FABRICADO POR:

Citromax Indústria e Comércio LTDA,
CNPJ: 00.187.467/0001-92
Mario Pagliosa, 708, Área Industrial Sul
São Lourenço do Oeste - SC/CEP:89990000
www.citromax.ind.br
sac@citromax.ind.br
Fone: (49) 3344-3087

